

PRÁCTICA DIRIGIDA DE QUÍMICA_SEMA

Bienvenido(a) SAUCEDO BATALLANOS MARLON NILO

Indicación:

La Evaluación Virtual se rinde una sola vez, por ello es importante que lo finalice.

NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

Química


Finalizar Evaluación

Pregunta 1 - Química

Puntúa como: 1.00

Tema: Funciones oxigenadas

Los compuestos orgánicos oxigenado, son ternario, contienen oxígeno divalente formando parte del respectivo grupo funcional. En la siguiente estructura molecular indique a los grupos funcionales presentes.



- ☐ carbonilo, hidróxido, éster
- ☐ hidroxilo, éter, carboxilo
- ☐ hidroxilo, aldehído, carbonilo
- ☐ carbonilo, hidroxilo, carboxilo
- ☐ éter, hidroxilo, carboxilo

Quitar selección

Pregunta 2 - Química

Puntúa como: 1.00

La siguiente fórmula molecular $C_4H_{10}O$ corresponde a varios monoles con isomería de cadena y de posición. Marque la alternativa que contenga, en el orden dado, el nombre IUPAC del alcohol terciario y del alcohol secundario.


- ☐ 2-metil-2-propanol y 2-metil-1-propanol
- ☐ 2-metil-1-propanol y 2-butanol
- ☐ 2-metil-2-propanol y 2-butanol
- ☐ 2-metil-2-propanol y 1-butanol
- ☐ 2-metil-1-propanol y 2-propanol

Quitar selección

Pregunta 3 - Química

Puntúa como: 1.00

Respecto a la siguiente estructura molecular:



Marque verdadero (V) o falso (F) luego de analizar las siguientes proposiciones:

- I. Se trata de un alcohol secundario con fórmula molecular $C_7H_{16}O$.
- II. Es un diol porque el grupo hidroxilo está unido a un carbono secundario.
- III. Su nomenclatura IUPAC es: 5-metil-4-hexanol.

- ☐ VVF
- ☐ VFV
- ☐ VFF
- ☐ FFF
- ☐ FVF

1h 29m 52s



Quitar selección

NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

Química

Pregunta 4 - Química

Puntúa como: 1.00

Los alcoholes y éteres son isómeros funcionales, pues presentan propiedades físicas y químicas diferentes. En base a lo anterior determine verdadero (V) o falso (F) cada proposición y marque la alternativa correspondiente.

- I. El 1-butanol es isómero con el 1-metoxipropano, cuya fórmula es $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--O--CH}_2\text{--CH}_3$.
- II. A una misma temperatura, el dietiléter posee mayor presión de vapor que el 2-butanol.
- III. El isómero 3-metil-2-metoxihexano posee 27 átomos.


- ☐ VVV
- ☐ FVV
- ☐ FVF
- ☐ FFF
- ☐ FFV

Quitar selección

Pregunta 5 - Química

Puntúa como: 1.00

Ciertos alcoholes son oxidados para dar aldehído y si se continua el proceso de oxidación, se pueden obtener ácidos carboxílicos. Considerando el siguiente aldehído:



Indique las proposiciones correctas.

- I. El alcohol utilizado es secundario de fórmula molecular $\text{C}_9\text{H}_{20}\text{O}$
- II. El nombre IUPAC es 2,4,5-trimetilhexanal
- III. El ácido producido es monocarboxílico


- ☐ II y III
- ☐ I, II y III
- ☐ I y II
- ☐ solo I
- ☐ solo II

Quitar selección

Pregunta 6 - Química

Puntúa como: 1.00

El siguiente compuesto proviene de la oxidación del compuesto 4,6,7-trimetiloctan-2-ol



Indique la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. Es una cetona simétrica
- II. El nombre IUPAC es 4,6,7-trimetiloctan-2-ona
- III. Fácilmente se oxida generando el respectivo éster

- ☐ VVV

1h 29m 52s



- ☐ FFF
- ☐ VVF
- ☐ FVF
- ☐ FFV

Quitar selección

NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

Química

Pregunta 7 - Química

Puntúa como: 1.00

En base a la siguiente estructura molecular, cuya fórmula topológica se muestra, indique verdadero (V) o falso (F) al evaluar las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta.



- I. Se trata de un ácido monocarboxílico insaturado.
- II. Su nomenclatura IUPAC es ácido-4-isopropil-3,7-dimetiloctanoico.
- III. Su fórmula molecular es C₁₃H₂₆O₂.


- ☐ FVV
- ☐ FFV
- ☐ VFV
- ☐ VVV
- ☐ FVF

Quitar selección

Pregunta 8 - Química

Puntúa como: 1.00

Mediante la reacción reversible de alcohol y ácido carboxílico, en medio ácido, se obtiene éster con agua. Los esteres (no grasos) caracterizan el olor agradable de las frutas, rosas y flores. La siguiente fórmula corresponde a la sustancia con olor característico del plátano



De las siguientes proposiciones, indique cuáles son correctas.

- I. Su nombre es etanoato de isopentilo.
- II. Para su obtención reacciono el ácido acético.
- III. Cuando se hidroliza se obtiene un alcohol cuya fórmula es CH₃CH(CH₃)CH₂OH.

- ☐ solo I
- ☐ I y II
- ☐ solo II
- ☐ II y III
- ☐ I, II y III

Quitar selección

Pregunta 9 - Química

Puntúa como: 1.00

1h 29m 52s



Los compuestos polifuncionales llamado tambien compuestos heterofuncionales, contienen dos o mas grupos funcionales. Por ejemplo el siguiente compuesto molecular $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_2\text{-CHOH-CH=CH-COOH}$
Al respecto indique las proposiciones correctas.
I. posee tres grupos funcionales
II. el grupo funcional principal es el carboxilo
III. El nombre IUPAC es ácido 4-hidroxi-6-oxoheptenoico

- ☐ solo I
- ☐ solo II
- ☐ solo III
- ☐ I y II
- ☐ I y III

Quitar selección

NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)

[Química](#)

Pregunta 10 - Química

Puntúa como: 1.00

Los isómeros son compuestos orgánicos con la misma fórmula molecular pero con propiedades diferentes. Indique la alternativa que no contiene a isómeros.

- ☐ 2-hexanol y hexan-1-ol
- ☐ etilpropilcetona y valeraldehído
- ☐ propanoato de etilo y ácido valerico
- ☐ 3-pentanona y 1-penten-2-ona
- ☐ 2-metilbutanal y valeraldehido

Quitar selección

1h 29m 52s

